

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2026






VITOCHIM 247 SC

Reg. PQUA N°3807 - SENASA

VITOCHIM 247 SC está compuesto por lambda-cyhalothrin, un insecticida piretroide de contacto e ingestión y de amplio espectro y thiamethoxam, un insecticida neonicotenoide altamente sistémico y de amplio espectro. Presenta un buen efecto residual sobre insectos del suelo y follaje. En pimiento se recomienda la aplicación foliar y en brotes.

PRESENTACIÓN:

1L.



Ingrediente Activo:
Lambda-cyhalothri 107 g/L +
Thiamethoxam 142.1 g/L

	PLAGA	DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
		ml/cilindro 200 L	L / Ha		
Pimiento	Mosquilla de los brotes <i>Prodiplosis longifila</i>	125	0.145	5	0.2(1) 0.1(2)

PC: Período de Carenia. 1. Lambda-cyhalothrin 2. Thiamethoxam LMR: Límite Máximo de Residuos


RODRILAM DUO

Reg. PQUA N°3858 - SENASA

RODRILAM DUO es un insecticida que combina la acción de los ingredientes activos: Dinotefuran, que actúa como un agonista de receptores nicotínicos de acetilcolina de insectos lo que afecta la sinapsis en el sistema nervioso central del insecto; y también Fipronil, que actúa mediante el bloqueo del efecto del neurotransmisor Ácido y amino butírico (GABA), el principal neurotransmisor inhibidor en insectos.

PRESENTACIÓN:

100 g.



Ingrediente Activo:
Dinotefuran 400 g/Kg +
Fipronil 400 g/Kg

	PLAGA	DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
		Kg/200 L	Kg/ Ha		
Espárrago	Mosquilla de los brotes <i>Prodiplosis longifila</i>	0.1- 0.2	0.325-0.65	21	0.01 (a) 0.005 (b)

PC: Período de Carenia. a)Dinotefuran b)Fipronil LMR: Límite Máximo de Residuos

OGRO 50 SG

Reg. PQUA N°3662 - SENASA

OGRO 50 SG es un insecticida agrícola de contacto o de ingestión, actúa bloqueando la transmisión neuroquímica provocando contracciones en los músculos del insecto, su parálisis y finalmente la muerte.

PRESENTACIÓN:

100 g.



Ingrediente Activo:
Emamectin benzoato
Concentración: 50 g/Kg

	PLAGA	DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
		Kg/ha	g/cil 200 L		
Espárrago	Gusano perforador <i>Heliothis virescens</i>	0.419	150	30	0.001

PC: Período de Carenia. LMR: Límite Máximo de Residuos

ZIGOR 20 SG

Reg. PQUA N°3084 - SENASA

ZIGOR 20 SC es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, sistémico y con buen efecto residual y de amplio espectro.

ZIGOR 20 SC actúa mediante el bloqueo del efecto del neurotransmisor Ácido y amino butírico (GABA), el principal neurotransmisor inhibidor en insectos.

PRESENTACIÓN:

1 L.



Ingrediente Activo:
Fipronil 200 g/L

Cultivo	Plaga		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/200L	L/ha		
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	200	0.5	30	0.005
Papa	Gorgojo de los Andes	<i>Premnotypes suturicallus</i>	-	0.4-0.5	28	0.02

PC: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos

OPTIK 150 WG

Reg. PQUA N°2845 - SENASA

OPTIK 150 WG, es un insecticida que actúa por ingestión, con un ligero efecto de contacto, contiene Emamectin benzoato, insecticida con efecto translinar, el cual genera depósitos de emamectina en el mesófilo de las hojas aplicadas, este insecticida al ser ingerido actúa sobre dos receptores post sinápticos generando un flujo constante de iones cloro afectando el sistema neuromuscular del insecto.

OPTIK 150 WG también contiene Lufenuron, ingrediente activo altamente lipofílico que le confiere persistencia sobre la superficie foliar, este insecticida actúa por ingestión inhibiendo la síntesis de quitina de los primeros estadios larvales, interfiriendo en el proceso de la muda.

PRESENTACIÓN:

100 g.



Ingrediente Activo:
Emamectin benzoato 50 g/Kg +
Lufenuron 100 g/Kg

	PLAGA	DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
		Kg/200L		
Pimiento	Gusano del capullo del pimiento <i>Heliothis virescens</i>	0.1	14	a) 0.02 b) 0.8

PC: Período de Carenia. a) Emamectin benzoato b) Lufenuron LMR: Límite Máximo de Residuos

NUEVO
INSECTICIDA

IMIDAZAN 350 SC

Reg. PQUA N°4289 - SENASA

IMIDAZAN 350 SC, es un insecticida de acción sistémica con amplio espectro de acción, especialmente efectivo contra insectos masticadores, minadores, chupadores y raspadores.

IMIDAZAN 350 SC actúa en los receptores nicotinérgicos de acetilcolina (nAChR) en el sistema nervioso de los insectos interfiriendo con la transmisión de estímulos en el sistema nervioso central del insecto causando hiperexcitación, convulsiones, parálisis y finalmente la muerte del insecto.

PRESENTACIÓN:

1 L.



Ingrediente Activo:
Imidacloprid 350 g/L

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P. C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	ml/cil 200 L		
ARÁNDANO	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	-	150-200	7	5
CEBOLLA	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.45	150	5	0.1

PC: Período de Carenia.

LMR: Límite Máximo de Residuos

NUEVO
INSECTICIDA

SANATIO 120 SC

Reg. PQUA N°4391 - SENASA

SANATIO 120 SC es un insecticida con modo de acción por contacto e ingestión que actúa sobre los insectos principalmente lepidópteros. Por su mecanismo de acción actúa excitando el sistema nervioso de los insectos, provocando su desequilibrio y muerte.

SANATIO 120 SC se emplea diluido en agua. Se recomienda preparar una pre-mezcla, distribuyendo la cantidad necesaria del producto en un balde, luego vaciar al recipiente de mezclado definitivo y completar la cantidad de agua según las recomendaciones.

PRESENTACIÓN:

1 L.



Ingrediente Activo:
Spinosad 120 g/L

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	ml/cil 200 L		
ARÁNDANO	Gusano perforador	<i>Chloridea virescens</i>	0.075-0.10	-	3	1.5
MAÍZ	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	-	0.1	14	2

PC: Período de Carenia

LMR: Límite Máximo Residuos

**PRÓXIMA
MENTE**

K-RADIA FIPRONIL 200 SC

K-RADIA es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, sistémico y con buen efecto residual y de amplio espectro.

K-RADIA actúa mediante el bloqueo del efecto del neurotransmisor Ácido y amino butírico (GABA), el principal neurotransmisor inhibitor en insectos.

PRESENTACIÓN:

1 L.




Ingrediente Activo:
Fipronil 200 g/L

Cultivo	Plaga		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/200L	L/ha		
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodioplosis longifolia</i>	200	0.5	30	0.005
Papa	Gorgojo de los Andes	<i>Premnotypes suturicallus</i>	-	0.4-0.5	28	0.02

PC: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos



BUHO 45 EC

Reg. PQUA N°3661 - SENASA

BUHO 45 EC, es un fungicida del grupo de los imidazoles, cuyo ingrediente activo es el prochloraz, actúa por contacto, de acción translinar. Actúa inhibiendo la biosíntesis de ergosterol produciendo el detenimiento del crecimiento y posterior muerte del hongo. Se considera de acción protectante y erradicante.

PRESENTACIÓN:
1L.



Ingrediente Activo:
Prochloraz
Concentración: 450 g/L

	PLAGA	DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
		L / Ha		
Palto	Muerte regresiva <i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.1%	14	7

PC: Período de Carenia.

LMR: Límite Máximo de Residuos

HELATXIL 760 WP

Reg. PQUA N°3717 - SENASA

HELATXIL 760 WP es un fungicida especializado para el control de la rancho y de patógenos del orden peronosporales en el cultivo de papa, entre otros. Su acción altamente preventiva y curativa, erradica la enfermedad.

PRESENTACIÓN:
1 Kg.



Ingrediente Activo:
Propineb 700 g/Kg +
Cymoxanil 60 g/Kg

	PLAGA	DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
		Kg/200 L	Kg/ Ha		
Papa	Hielo fungoso, rancho o seca seca <i>Phytophthora infestans</i>	0.5	1.0	14	0.1

PC: Período de Carenia.

LMR: Límite Máximo de Residuos

TROBINZOL 325 SC

Reg. PQUA N°3663 - SENASA

TROBINZOL 325 SC es un fungicida sistémico de amplio espectro con acción protectora y curativa. Es empleado en el cultivo de espárrago para el control de *Puccinia asparagi*. Está constituido por azoxystrobin y difenoconazole.

PRESENTACIÓN:
1 L.



Ingrediente Activo:
Azoxystrobin 200 g/L + Difenconazole 125 g/L

	PLAGA	DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
		ml/cilindra 200 L	L / Ha		
Espárrago	Roya del espárrago <i>Puccinia asparagi</i>	0.2	0.583	100	0.01
Arándano	Blueberry leaf rust <i>thekopsora minima</i>	0.15-0.2	-	1	a)5 b)0.1

PC: Período de Carenia.

a)Azoxystrobin b)Difenconazole

LMR: Límite Máximo de Residuos

KANSAS

Reg. PQUA N°3331 - SENASA

KANSAS es un fungicida sistémico con movimientos a través del xilema, con poder protectante y curativo. Inhibe la esporulación del hongo, una vez que este ha ingresado a la planta, evitando su propagación y reproducción.

PRESENTACIÓN:
100 g.



Ingrediente Activo:
Azoxystrobin 500 g/kg

	PLAGA	DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
		Kg / ha		
Vid	Oidiosis <i>Erysiphe necator</i>	0.2	14	3.0

PC: Período de Carenia.

LMR: Límite Máximo de Residuos

CICLAMEN

Reg. PQUA N°3214 - SENASA

CICLAMEN es un poderoso fungicida de acción preventiva, curativa, sistémico y de contacto. El fungicida es absorbido rápidamente por las plantas afectando el desarrollo del hongo antes que se presenten los síntomas y cuando éstos ya son visibles.

PRESENTACIÓN:
1L.



Ingrediente Activo:
Difenoconazole 250 g/L +
Propiconazole 250 g/L

	PLAGA	DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
		Kg/200 L		
Arroz	Pyricularia <i>Pyricularia oryzae</i>	0.25 - 0.3	35	a) 3.0 b) 7.0

PC: Período de Carenia. a)Difenoconazole b)Propiconazole LMR: Límite Máximo de Residuos

NUEVO
FUNGICIDA

SPYRIT 750 WG

Reg. PQUA N°4265 - SENASA

SPYRIT 750 WG es un fungicida sistémico con acción preventiva y protectora cuyos ingredientes activos tienen mecanismos de acción complementaria, el azoxystrobin inhibe la germinación de las esporas y crecimiento micelial mientras que el tebuconazole inhibe la síntesis de ergosterol esencial para la formación de las membranas celulares del hongo, lo que conlleva a su muerte.

PRESENTACIÓN:
100 g.



Ingrediente Activo:
Azoxystrobin 250 g/Kg +
Tebuconazole 500 g/Kg

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	Kg/cil		
ESPÁRRAGO	"Mancha púrpura"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.3	-	40	*0.04 **0.05
CAFÉ	"Roya Amarilla"	<i>Hemileia vastatrix</i>	-	0.2	30	*0.03 **0.15
VID	"Oidium"	<i>Erysiphe necator</i>	0.25	-	14	*3 **0.5

PC: Período de Carenia LMR: Límite Máximo de Residuos
*LMR Azoxystrobin **LMR Tebuconazole

NUEVO
FUNGICIDA

SOYCAPO 540 SC

Reg. PQUA N°4357 - SENASA

SOYCAPO 540 SC, es un fungicida que provee la actividad sistémica del dimethomorph y la actividad protectora de contacto de chlorothalonil.
SOYCAPO 540 SC, actúa por interrupción en la formación de la pared celular, interfiriendo con el crecimiento normal del hongo, lo que puede dirigir a la lisis de la pared celular y a la muerte de la célula fúngica. También posee actividad protectora residual que interviene en los procesos metabólicos del hongo.

PRESENTACIÓN:
1 L.



Ingrediente Activo:
Chlorothalonil 450 g/L +
Dimethomorph 90 g/L

CULTIVO	P L A G A		DOSIS		P. C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	L/200 L		
PAPA	"Rancha o hielo fungoso"	<i>Phytophthora infestans</i>	1.5 - 2	0.75 - 1	7	0.50* 0.02**

P. C.: Período de Carenia (*) Dimethomorph (**) Chlorothalonil LMR: Límite Máximo Residuos

NUEVO
FUNGICIDA

TROVA 540 SC

Reg. PQUA N°888 - SENASA

TROVA® 540 SC es un fungicida que provee la actividad sistémica del dimethomorph y la actividad protectora de contacto de chlorothalonil.
TROVA 540 SC actúa por interrupción en la formación de la pared celular, interfiriendo con el crecimiento normal del hongo, lo que puede dirigir a la lisis de la pared celular y a la muerte de la célula fúngica. También posee actividad protectora residual que interviene en los procesos metabólicos del hongo.

PRESENTACIÓN:
1 L.



Ingrediente Activo:
Chlorothalonil 450 g/L +
Dimethomorph 90 g/L

CULTIVO	P L A G A		DOSIS		P. C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	L/cil 200 L		
PAPA	"Rancha o hielo fungoso"	<i>Phytophthora infestans</i>	1.5 - 2	0.75 - 1	7	0.50* 0.02**

(*) Dimethomorph (**) Chlorothalonil LMR: Límite Máximo Residuos
P. C.: Período de Carenia

NUEVO
FUNGICIDA

CERCEI

Reg. PQUA N°4044 - SENASA

CERCEI es un fungicida de acción sistémica y traslaminar, actúa inhibiendo la esporulación de los oomicetos, la síntesis de fosfolípidos y ácidos grasos.

Para la preparación de la mezcla, debe calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se protege. Llenar el tanque de mezcla con la mitad de agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo con la dosis recomendada y agitar hasta obtener una mezcla homogénea. Completar el resto del volumen con agua y continuar.

PRESENTACIÓN:

1L.



Ingrediente Activo:
Fluopicolide 62.5 g/L +
Propamocarb hydrochloride 625 g/L

Cultivo	Plaga		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200L	L/Ha		
Papa	"Rancha"	Phytophthora infestans	0.6 – 0.8	1.8 – 2.4	14	0.2 ¹ 0.3 ²

PC: Período de carencia

1 Fluopicolide

2 Propamocarb

L.M.R.: Límite máximo de residuos

Volumen de agua: 600 L/ha






GUILLOTIN

Reg. PQUA N°2954- SENASA

GUILLOTIN es un herbicida sistémico post emergente, no selectivo, controla las malezas, indicadas en el cuadro de usos, de hoja ancha y gramíneas, tanto anuales como perennes. Inhibe la síntesis de ácidos aromáticos esenciales, necesaria para la síntesis de proteínas, afectando el crecimiento celular.

PRESENTACIÓN:

1 Kg.



Ingrediente Activo:

Glyphosate ammonium salt. 880 g/Kg

	PLAGA	DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
		L/200L		
Palto	Amor seco	0.8	7	0.1
	<i>Bidens Pilosa</i>			
	Coquito			
	<i>Cyperus rotundus</i>			
	Pata de Gallina			
	<i>Eleusine indica</i>			
	Trianthema			
	<i>Trianthema portulacastrum</i>			

PC: Periodo de Carenia.

LMR: Límite Máximo de Residuos

NUEVO
HERBICIDA

NOYERBA 480 SC

Reg. PQUA N°4357 - SENASA

NOYERBA 480 SC es un herbicida pre y post emergente sistémico y selectivo utilizado para el control de malezas de hoja ancha y gramíneas. Los síntomas de clorosis y necrosis completa aparecen en las malezas afectadas después de 2 a 5 días.

PRESENTACIÓN:

1 L.



Ingrediente Activo:

Metribuzin 480 g/L

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L. Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ESPÁRRAGO	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>	0.2	14	0.1
	"Chamico"	<i>Datura stramonium</i>			
	"Pajilla"	<i>Leptochloa unineria</i>			
	"Cadiño"	<i>Cenchrus echinatus</i>			
	"Capulí cimarrón"	<i>Physalis peruviana</i>			
	"Grana china"	<i>Sorghum halepense</i>			
	"Rabo de zorro"	<i>Sisymbrium</i> spp.			
	"Grana dulce"	<i>Cynodon dactylon</i>			
	"Amor seco"	<i>Bidens pilosa</i>			
	"Lechera"	<i>Euphorbia</i> sp.			

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Periodo de Carenia.





GLICINA BETAINA

GLICINA BETAINA, es un producto de alta calidad rico en osmolitos orgánicos compatibles que contiene glicina betaina, que protege y fortalece los daños oxidativos de los cultivos ante factores climáticos extremos tales como sequías, temperaturas extremas, salinidad, irradiación luminosa excesiva, virosis, asfixia radicular y el ataque de plagas.

PRESENTACIÓN:
1L.




COMPOSICIÓN QUÍMICA

Glicina Betaina	20%
AATC (Ácido N-acetyl-thiazolidin-4 carboxílico).....	0.5%
Ácido fólico.....	10 ppm
Algas marinas.....	10%
Aminoácidos totales.....	5%
Macro Nutrientes.....	5%
Micro nutrientes.....	5 ppm

QUITOSANO

QUITOSANO, es un bioestimulante del crecimiento vegetal, formulado y enriquecido con Algas marinas y aminoácidos. Diseñado para ser utilizado vía foliar, fertirriego y drench. Promueve el desarrollo de raíces y tallos, además activa los mecanismos de defensa natural de las plantas.

PRESENTACIÓN:
1L.



COMPOSICIÓN QUÍMICA

Polimero D-Glucosamina (Quitosano).....	5% p/v
Algas marinas.....	5%
Aminoácidos.....	3%

ALGAS MARINAS

ALGAS MARINAS Bioestimulante orgánico que acelera el desarrollo y crecimiento de las plantas, formulado con extractos naturales de algas marinas, aminoácidos procedentes de restos marino, enriquecidos con proteínas, nutrientes tales como Nitrógeno, Fósforo, Potasio y otros nutrientes que son fácilmente absorbidos por las plantas.

PRESENTACIÓN:
1 L.




COMPOSICIÓN QUÍMICA

Algas Marinas (Ascophillum nodosum, Phaeophyceae y Sargassum)...	30.0%
Aminoácidos libres.....	70 g/L
Nitrógeno orgánico.....	90 g/L
Fósforo (P2O5).....	50 g/L
Potasio (K2O).....	30 g/L
Magnesio (Mg).....	180 mg/L
Hierro (Fe).....	140 mg/L
Zinc (Zn).....	80 mg/L
Manganeso (Mn).....	40 mg/L
Molibdeno (Mo).....	15 mg/L
Cobalto (Co).....	10 mg/L
Boro (B).....	15 mg/L
Aditivos estabilizantes.....	80 g/L

TRI-H

TRI-H, Es un bioestimulante foliar obtenido por procesos biotecnológicos de fermentación enzimática de materia orgánica vegetal, ofreciendo una fuente de promotores hormonales vegetales (Auxinas, Giberelinas y Citoquininas), induce a la misma planta a activar sus propias hormonas naturales de acuerdo a su ciclo fisiológico, mejorando una mayor translocación de los nutrientes, retrasando la senescencia y optimizando la producción de los frutos.

PRESENTACIÓN:
1 L.



COMPOSICIÓN QUÍMICA

Precursor Trihormonal natural (*)...	5%
(Inductor de auxinas, Giberelinas y Citoquininas)	
Extracto de Algas.....	5%
Ácido Algínico.....	3.80%
Aminoácidos	6%
Betainas.....	10 ppm
Ácidos orgánicos	
Acomplejados.....	10%
Macro Nutrientes.....	2%
Micro Nutrientes.....	0.05%

(*) Basado en su actividad biológica.

STYM

AATC - ÁCIDO FÓLICO
(50 g/L) (1.5 g/L)

STYM, es un nutriente bioestimulante de gran poder de penetración y de rápida acción, obtenido por hidrólisis de proteínas de origen vegetal y animal con un alto contenido de aminoácidos, AATC (Acido N-acetil-tiazolidin-4-carboxílico), ácido fólico, en combinación con el Nitrógeno, complejo vitamínico, las algas marinas y enzimas bioactivadoras, que incrementa la actividad enzimática, favoreciendo la síntesis de carbohidratos, aumenta los niveles de prolina en las células para la resistencia a diversos factores climáticos.

PRESENTACIÓN:
1L.



COMPOSICIÓN QUÍMICA


AMINOÁCIDOS

(Lisina, ácido glutámico, treonina, alanina, triptofano, metionina, asparagina, prolina, cisteína, histidina, glicina, arginina, ácido aspártico).....10%
AATC.....5%
ÁCIDO FÓLICO.....1.5%
NITRÓGENO AMINICO (N).....3.5%
ALGAS MARINAS.....75g/L
ENZIMAS BIOACTIVADORAS.....0.2 ppm

BOOSTER K50

BOOSTER K50, Bioestimulante no hormonal, formulado especialmente para la fructificación a base de bicitrato de potasio, salicilato de potasio, gluconato de potasio y aminoácidos que son extraídos por hidrólisis enzimática que permite una rápida asimilación de Potasio por la planta hacia los órganos de almacenamiento, mejorando el crecimiento, llenado, calidad de los frutos y durabilidad de post cosecha.

PRESENTACIÓN:
1L.



COMPOSICIÓN QUÍMICA

Complejo de Potasio..... 50%
Bicitrato de Potasio..... 25%
Salicilato de Potasio..... 10%
Gluconato de Potasio..... 15%
Aminoácidos..... 2%

ROOTS FORTE

ROOTS FORTE, bioestimulante natural elaborado con activadores procedentes de extractos vegetales hidrolizados que promueven la activación de citoquininas naturales y betainas que superan las etapas después del transplante. Aumenta la masa de pelos absorbentes y elongación de las raíces.

PRESENTACIÓN:
1 L.



COMPOSICIÓN QUÍMICA

Extractos de algas 6%
Glicina Betaina..... 3%
Quitosano..... 1%
Aminoácidos 2%
Magnesio (Mg) 0.04%
Zinc (Zn) 0.09%
Boro (B) 0.056%
Manganeso (Mn) 0.075%
Cobre (Cu) 0.002%
Hierro (Fe)..... 0.035%
Molibdeno (Mo) 0.01%
Cobalto (Co) 0.015%

ZINC

(Zn 15% + ALGAS)

ZINC 15%+ALGAS, es un complejo orgánico líquido quelatizado con ácidos orgánicos, especialmente formulado para prevenir y corregir rápidamente las deficiencias de éste micronutriente. Es sistémico y puede aplicarse foliarmente o vía sistema de riego.

PRESENTACIÓN:
1L.



COMPOSICIÓN QUÍMICA


Complejo Orgánico con Zinc(*)..... 15%
Inertes Estabilizantes..... 85%
(*) Agente Quelatante: Ácidos orgánicos




SHIKO 100

SHIKO 100 es una silicona para uso agrícola, con propiedades penetrantes y humectantes que mejoran la eficacia de los productos agroquímicos. Reduce la tensión superficial de las mezclas acuosas agrícolas significativamente más bajo de lo que se puede lograr con agentes tensioactivos no iónicos convencionales.

PRESENTACIÓN:
1L.



HOJA SIN
SHIKO 100



HOJA CON
SHIKO 100

DOSIS:

Agroquímicos	Dosis	
	Cil 200 litros	Concentración
Fungicidas	10 - 30	0.05 - 0.015 %
Herbicidas	30 - 50	0.015 - 0.025 %
Insecticidas	20 - 50	0.010 - 0.025 %
Reguladores de crecimiento	10 - 50	0.05 - 0.025 %
Fertilizantes foliares	30 - 50	0.10 - 0.015 %
Lavado de Plantas	100 a 300 ml/Cil	

FIJADOR pH

FIJADOR pH, es un producto foliar altamente concentrado que tiene como propiedades de ablandador de agua, adherente, penetrante, acidificante, dispersante y regulador de pH. Cuya formulación permite obtener mejores resultados en las cosechas, debido que contiene aditivos orgánicos, diluyentes, humectantes, proporcionando mayor eficacia de la aplicación conjuntamente con los agroquímicos.

PRESENTACIÓN:
1L.



DOSIS:

Dosis Recomendada	Cilindro 200 L	Mochila cc.	pH
Con Insecticidas	50 - 100	10 - 15	6.5
Con Fungicidas	80 - 120	12 - 18	5.5
Con Herbicidas	100 - 150	15 - 20	4.5

ADHERENTE

HUMECTANTE - SURFACTANTE

ADHERENTE, es un fertilizante líquido foliar con componentes tensoactivos, coadyuvantes que aumentan la capacidad de penetración de los agroquímicos.

PRESENTACIÓN:
1L.



DOSIS:

APLICACIONES	DOSIS 200L/ AGUA
Insecticidas	60 cc - 100 cc
Fungicidas	60 cc - 100 cc
Herbicidas	80 cc - 150 cc

DETERGENTE POTÁSICO

DETERGENTE POTÁSICO, Es un producto orgánico que está compuesto por sales potásicas de ácidos grasos procedentes de aceites vegetales.

PRESENTACIÓN:
1 L.



DOSIS & APLICACIONES

El producto tiene un efecto inmediato en la limpieza, por lo que se debe mojar bien la planta a tratar durante la pulverización.

Aplicación preferentemente en la tarde.

La concentración recomendada para la aplicación foliar es de: 0.5-1 L/200L de agua.

Lavado de frutas y vegetales..... 500mL / 20L

ACEITE AGRICOLA

ACEITE AGRÍCOLA, Es un poderoso microencapsulador que actúa como coadyuvante: dispersante, humectante, adherente, surfactante; que mejora las propiedades y aumenta la permanencia del principio activo de los plaguicidas (insecticidas, fungicidas, herbicidas, etc.) sobre la superficie vegetal.

PRESENTACIÓN:
1L.



DOSIS:

La proporción de la dosis a usar en las mezclas para hacer el encapsulado con los insecticidas, fungicidas, herbicidas, es de 1 a 1.

Para mezcla con líquidos:

Para mezclar con plaguicidas líquidos, hacer la mezcla con la misma cantidad de aceite vegetal con el plaguicida en un depósito y agitar bien hasta mezclarse. Luego se añade la premezcla al cilindro. Las mezclas por cada producto a usar se hacen por separado.

JABON CUPRICO

Jabón Cúprico, es un producto orgánico que está compuesto por sales potásicas de ácidos grasos procedentes de aceites vegetales y Cobre.

Es un moderno detergente líquido de pH neutro, totalmente biodegradable, compuesto por sustancias tensoactivas y aditivos, que garantiza una eficaz acción de limpieza y una protección máxima del medio ambiente, se comporta como humectante y solubilizante por lo que elimina todo tipo de suciedad.

PRESENTACIÓN:
100 g.



DOSIS:

Jabón Cúprico es efectivo para la limpieza en las plantas, por lo que se debe mojar bien la planta a tratar pulverizar.

Aplicación preferentemente en la mañana y en las tardes.

La concentración recomendada para la aplicación foliar es de: 0.5-1 L/200L de agua.

Lavado de frutas y vegetales 500ml/20L

JABON POTASICO

Jabón Potásico, es un producto orgánico que está compuesto por sales potásicas de ácidos grasos procedentes de aceites vegetales.

PRESENTACIÓN:
100 g.



DOSIS:

Jabón potásico es efectivo para la limpieza en las plantas, por lo que se debe mojar bien la planta a tratar pulverizar.

Aplicación preferentemente en la mañana y en las tardes.

La concentración recomendada para la aplicación foliar es de: 0.5-1 L/200L de agua.

Lavado de frutas y vegetales 500ml/20L

CORRECTOR DE SALES

Corrector de Sales, Es un producto formulado a partir de Óxido de calcio, lignosulfonato de calcio, citrato de calcio, sulfato de calcio y ácidos orgánicos que mejoran las condiciones físico-químicas del suelo, lo que se refleja en un mejor drenaje y estructura, capacidad de intercambio catiónico y disponibilidad de humedad.

PRESENTACIÓN:
1 L.



COMPOSICIÓN QUÍMICA

Lignosulfato de Calcio 10 %
Citrato de calcio 20 %
Sulfato de calcio..... 0.05 %

Ácidos orgánicos..... 4 %
Acondicionadores, Coadyuvantes
y dispersantes..... 52.5 %



Ácidos Húmicos
Polvos solubles e
Inductores de
Defensas

HUMATO DE POTASIO

La materia prima de este producto es el lignito (leonardita). Es fácilmente soluble en agua. El humato de potasio es la sal potásica del ácido húmico. Se fabrica comercialmente mediante la extracción alcalina del lignito (leonardita) y se utiliza principalmente como acondicionador de suelos y estimulante del sistema radicular. El humato de potasio es un producto hidrosoluble que nutre las plantas y contribuye al desarrollo radicular vigoroso y a una mejor producción. Posee una mayor actividad quelante, lo que facilita la absorción de nutrientes minerales por las plantas.

PRESENTACIÓN:
25 Kg.



COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ácido Húmico.....	60%
K ₂ O.....	10%
pH:.....	9-11

ÁCIDO FÚLVICO

El ácido fúlvico bioquímico, también conocido como ácido fúlvico, se extrae de plantas, carbón meteorizado, turba, etc., mediante fermentación biológica con bacterias especiales y un tratamiento químico. Es un material molecular de cadena corta de carbono extraído de plantas naturales, con alta capacidad de carga y actividad fisiológica.

PRESENTACIÓN:
25 Kg.



COMPOSICIÓN QUÍMICA


Ácido fúlvico (base seca).....	≥90%
Aminoácidos.....	≥5%
Potasio.....	≥10%

Inductores de Defensa

S-Cu

S-Cu, es un fertilizante bioinductor de defensas naturales a base de cobre en forma de sulfato, citrato y silicato, formulado para activar fisiológicamente las defensas de la planta cuya función es prevenir y controlar las enfermedades fungosas. Debido a la riqueza del cobre biodisponible libera iones tóxicos, para los hongos actuando como inhibidor

PRESENTACIÓN:
1 L.



COMPOSICIÓN QUÍMICA

Sulfato de cobre pentahidratado ...	255g/L
Citrato y silicato de cobre	30g/L
Ácidos orgánicos acomplejante	20g/L
Estabilizantes en solución acuosa.....	2%



INDICE

Insecticidas	01
Fungicidas	04
Herbicidas	08
Bioestimulantes	10
Coadyuvantes	13
Ácidos Húmicos Polvos solubles e Inductores de Defensas	16



*Av. Via de Evitamiento Nro. 1233
Urb. Parques de Monterrico
Salamanca - Ate - Lima - Perú
RUC:20511455775
Correo: inbior_ventas@yahoo.es*

www.inbior.com